

Titel: Northpop instruktion till personal på Förlossningen Skellefteå navelsträngsblod vid förlossning	Version: 1.2	Gäller fr. o. m: 2019-11-20 t.v.
Utfärdad av: Carina Lagerqvist	Datum: 2019-11-20	
Granskad av: Christina West	Datum:	

Northpop - Instruktion till personal på Förlossningen navelsträngsprov vid förlossning

Material:

Vacutainerrör, 6 ml EDTA (lila kork)

Northpop-remiss till Blodcentralen (pdf-fil kan laddas ner från hemsidan: www.northpop.se)

Prov:

- Till Northpop-studien tas ett extra vacutainerrör (EDTA, 6 ml, lila kork) i samband med övrig rutinprovtagning från navelsträngen.
- Röret ska fyllas så fullständigt som möjligt.
- Vänd röret ca 8-10 ggr direkt efter provtagning.
- Skriv ut 3 st klisteretiketter, fyll i barnets namn och personnummer och märk röret med en av etiketterna (de övriga etiketterna behövs för labbets hantering av proverna) .

NORTHPOP CHILD Pnr:..... Namn:..... Navelsträngsblod

Remiss:

Remissen för Northpop-proverna är en variant av ordinarie remiss till Blodcentralen som är märkt med Northpop-loggan.

- Häfta fast 2 st etiketter på remissen, dessa behövs för labbets hantering av proverna.
- Märk remissen med barnets namn och personnummer.
- Fyll i datum och tidpunkt för när provet togs. **OBS! Våldigt viktigt att tidpunkt anges för kontroll av kvaliteten på provet.**
- Skriv under för utförd ID-kontroll på remissen och kryssa i att det är ett navelsträngsprov.

Leverans:

Provet med tillhörande remiss och **de två extra klisteretiketterna** med barnets namn och personnummer ska snarast möjligt skickas med ordinarie provtransport till Klinisk kemi i Skellefteå där provet tas omhand. Målsättningen är att provet skall centrifugeras och frysas ned inom en timme från provtagningstillfället.

Vid frågor:

Kontakta Carina Lagerqvist, biomedicinsk analytiker, carina.lagerqvist@umu.se, tfn 090-785 22 86, eller studiekoordinator, info@northpop.se, tfn 072-245 45 57